



ACELERA BEZERRO

Descrição: Suplemento Mineral de Pronto Uso para Bovinos.

Composição: Farelo de soja (soja transgênica: espécie doadora de gene: *Agrobacterium* sp), uréia protegida (Prote-N), fosfato bicálcico, calcário calcítico, cloreto de sódio (sal comum), enxofre pecuário, óxido de magnésio, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de zinco, sulfato de cobalto, iodato de cálcio, selenito de sódio, cromo complexado, *Ruminobacter amylophilum*, *Ruminobacter succinogenes*, *Succinovibrio dextrinosolvens*, *Bacillus cereus*, *Lactobacillus acidophilus*, *Enterococcus faecium*, extrato de leveduras (*Saccharomyces cerevisiae*), levedura de cana de açúcar inativada, aditivo sensorial aromatizante, aditivo zootécnico melhorador de desempenho (Flavomicina), Anticoccidiano (Salinomicina Sodica), veículo q.s.p (caulim).

Indicações de uso: Suplemento mineral composto de ingredientes nobres de alto valor biológico indicado para bezerros na fase de cria e recria.

Modo de usar: Fornecer preferencialmente em cochos de sal coberto e com sistemas que evite o acúmulo de água.

Restrições: Não utilizar na alimentação de cavalos ou outros eqüídeos. A ingestão pode ser fatal.

Este produto contém URÉIA, e exige sempre a consulta prévia a um médico veterinário ou zootecnista e os seguintes cuidados para seu uso:

- Fornecer preferencialmente em cochos de sal coberto e com sistemas que evite o acúmulo de água;
- A quantidade de cochos deve ser calculada de acordo com o número de animais que consumirão o produto, e deve-se manter o cocho sempre com produto, evitando a oferta de grandes quantidades, pois os animais maiores tendem a alimentar-se primeiro e ingerir quantidades maiores que o recomendado;

- Manter o acesso dos animais a pastagens ou a alimentos volumosos;
- Na primeira semana de uso, utilizar o produto misturado a suplemento mineral na proporção de 1:1 para adaptação dos animais;
- Não utilizar o produto em animais com menos de dois meses de idade, em jejum, famintos ou debilitados e após submeter os animais a movimentações em trajetos longos;
- Em casos de fornecimento em excesso, os sinais de intoxicação são: respiração difícil, nervosismo, desequilíbrio e salivação excessiva. Procurar imediatamente um médico veterinário de sua confiança.

Este produto é de uso exclusivo de BOVINOS, sendo tóxico para animais não ruminantes.

Apresentação: Embalagens de 25 Kg.

Níveis de garantia por kg de produto:

PROTEINA BRUTA	100 g (MIN)
NNP EQUIVALENTE PROTEICO	45 g (MAX)
NUTRIENTES DIGESTIVEIS TOTAIS	100 g (MIN)
CALCIO	180 g (MAX)
CALCIO	120 g (MIN)
FOSFORO	55 g (MIN)
SODIO	20 g (MIN)
ENXOFRE	5 g (MIN)
FLUOR	600 mg (MAX)
FERRO	1.250 mg (MIN)
COBRE	1.800 mg (MIN)
MANGANES	1.400 mg (MIN)
ZINCO	5.600 mg (MIN)
MAGNESIO	5.500 mg (MIN)
CROMO	5 mg (MIN)
COBALTO	80 mg (MIN)
iodo	90 mg (MIN)
SELENIO	40 mg (MIN)
SALINOMICINA SÓDICA	1.800 mg
FLAVOMICINA	300 mg
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	17,5x10 ⁹ UFC
ENTEROCOCCUS FAECIUM	17,5x10 ⁹ UFC
RUMINOBACTER AMYLOPHILUM	15x10 ⁹ UFC
RUMINOBACTER SUCCINOGENES	15x10 ⁹ UFC
BACILLUS CEREUS	17,5x10 ⁹ UFC
SUCCINOVIBRIO DEXTRINOSOLVENS	22x10 ⁹ UFC
SACCHAROMYCES CEREVISIAE	8x10 ⁷ UFC