



## PROTEMIN LAC

**Descrição:** Concentrado para Vacas em Lactação.

**Composição:** Farelo de soja (soja transgênica: espécie doadora de gene: *Agrobacterium* sp), farelo de trigo, fosfato bicálcico, calcário calcítico, cloreto de sódio (sal comum), uréia pecuária, uréia protegida (Prote N), cromo complexado, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de cobalto, sulfato de zinco, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, iodato de cálcio, selenito de sódio, levedura de cana de açúcar inativada aditivo sensorial aromatizante, aditivo zootécnico melhorador de desempenho (Salinomycin), veículo q.s.p (Milho moído (Milho transgênico; espécie doadora de gene: *Bacillus thuringiensis*).

**Indicações de uso:** Indicado para vacas lactantes com produção média entre 7 a 15 litros de leite por dia.

**Modo de usar:** Produto pronto para uso. Fornecer sobre o volumoso, em cochos cobertos e com sistemas que evite o acúmulo de água, na quantidade de 250 a 500g por vaca/dia. Adaptar a dosagem gradativamente aos animais.

**Restrições:** Não utilizar na alimentação de cavalos ou outros eqüídeos. A ingestão pode ser fatal.

Este produto contém URÉIA, e exige sempre a consulta prévia a um médico veterinário ou zootecnista e os seguintes cuidados para seu uso:

- Fornecer preferencialmente em cochos de sal coberto e com sistemas que evite o acúmulo de água;
- A quantidade de cochos deve ser calculada de acordo com o número de animais que consumirão o produto, e deve-se manter o cocho sempre com produto, evitando a oferta de grandes quantidades, pois os animais maiores tendem a alimentar-se primeiro e ingerir quantidades maiores que o recomendado;
- Manter o acesso dos animais a pastagens ou a alimentos volumosos;

- Na primeira semana de uso, utilizar o produto misturado a suplemento mineral na proporção de 1:1 para adaptação dos animais;
- Não utilizar o produto em animais com menos de dois meses de idade, em jejum, famintos ou debilitados e após submeter os animais a movimentações em trajetos longos;
- Em casos de fornecimento em excesso, os sinais de intoxicação são: respiração difícil, nervosismo, desequilíbrio e salivação excessiva. Procurar imediatamente um médico veterinário de sua confiança.

Este produto é de uso exclusivo de BOVINOS, sendo tóxico para animais não ruminantes.

**Apresentação:** Embalagens de 25 Kg.

### Níveis de garantia por kg de produto:

UMIDADE -----	120 g (MAX)
PROTEINA BRUTA-----	900 g (MIN)
EXTRATO ETÉREO-----	14 g (MIN)
FIBRA BRUTA -----	55 g (MAX)
FIBRA EM DETERGENTE ÁCIDO (FDA)-----	60 g (MAX)
NNP EQUIVALENTE PROTEICO -----	705 g (MAX)
NUTRIENTES DIGESTIVEIS TOTAIS -----	470 g(MIN)
MATERIA MINERAL -----	140 g (MAX)
CALCIO-----	30 g (MAX)
CALCIO-----	20 g (MIN)
FOSFORO -----	5.000 mg (MIN)
SODIO -----	180 mg (MIN)
ENXOFRE -----	15 g (MIN)
FLUOR-----	50 mg (MAX)
FERRO -----	33 mg (MIN)
COBRE -----	2 mg (MIN)
MANGANES-----	3 mg (MIN)
ZINCO-----	6 mg (MIN)
MAGNESIO-----	1,4 mg (MIN)
CROMO -----	180 mcg (MIN)
COBALTO-----	0,3 mg (MIN)
IODO -----	0,3 mg (MIN)
SELENIO-----	0,05 mg (MIN)
SALINOMICINA-----	3 mg