



LEITE MAIS P

Descrição: Ração para Bovinos em Lactação.

Composição: Milho moído (Milho transgênico; espécie doadora de gene: *Bacillus thuringiensis*), farelo de soja (soja transgênica: espécie doadora de gene: *Agrobacterium sp*), refinazil, ureia pecuária, fosfato bicálcico, calcário calcítico, cloreto de sódio (sal comum), sulfato de cálcio, óxido de magnésio, sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de cobre, enxofre pecuário, cromo complexado, sulfato de cobalto, iodato de cálcio, selenito de sódio, vitamina AD3, vitamina E, extrato de leveduras (*Saccharomyces cerevisiae*), levedura de cana de açúcar inativada, aditivo sensorial aromatizante (Powarome PR), aditivo zootécnico melhorador de desempenho (flavomicina), anticoccidiano (Monensina sódica), veículo q.s.p.

Indicações de uso: Indicado para vacas lactantes com produção média entre 8 a 15 quilos de leite por dia.

Modo de usar: Produto pronto para uso. Fornecer em cochos cobertos e com sistemas que evite o acúmulo de água, conforme orientação de um Médico Veterinário ou Zootecnista.

Restrições: Não utilizar na alimentação de cavalos ou outros eqüídeos. A ingestão pode ser fatal. Não utilizar na alimentação de patos, gansos, pombos. Este produto contém UREIA, e exige sempre a consulta prévia a um Médico Veterinário ou Zootecnista e os seguintes cuidados para seu uso:

- Fornecer preferencialmente em cochos de sal coberto e com sistemas que evite o acúmulo de água;
- A quantidade de cochos deve ser calculada de acordo com o número de animais que consumirão o

produto, e deve-se manter o cocho sempre com produto, evitando a oferta de grandes quantidades, pois os animais maiores tendem a alimentar-se primeiro e ingerir quantidades maiores que o recomendado;

- Manter o acesso dos animais a pastagens ou a alimentos volumosos;
 - Não utilizar o produto em animais com menos de dois meses de idade, em jejum, famintos ou debilitados e após submeter os animais a movimentações em trajetos longos;
 - Em casos de fornecimento em excesso, os sinais de intoxicação são: respiração difícil, nervosismo, desequilíbrio e salivação excessiva. Procurar imediatamente um médico veterinário de sua confiança.
- Este produto é de uso exclusivo de BOVINOS, sendo tóxico para animais não ruminantes.

Apresentação: Embalagens de 25 Kg.

Níveis de garantia por kg de produto:

PROTEINA BRUTA	180 g (MIN)
NNP EQUIVALENTE PROTEICO	36 g (MAX)
EXTRATO ETÉREO	27 g (MIN)
FIBRA BRUTA	50 g (MAX)
FIBRA EM DETERGENTE ÁCIDO (FDA)	20 g (MAX)
NUTRIENTES DIGESTIVOS TOTATIS	700 g (MIN)
MATERIA MINERAL	120 g (MAX)
CALCIO	30 g (MAX)
CALCIO	18 g (MIN)
FOSFORO	4.000 mg (MIN)
SODIO	2.000 mg (MIN)
ENXOFRE	420 mg (MIN)
FLUOR	60 mg (MAX)
FERRO	30 mg (MIN)
COBRE	17 mg (MIN)
MANGANES	25 mg (MIN)
ZINCO	65 mg (MIN)
MAGNESIO	700 mg (MIN)
CROMO	0,2 mg (MIN)
COBALTO	0,5 mg (MIN)
IODO	1 mg (MIN)
SELENIO	0,5 mg (MIN)
VITAMINA A	4.000 UI (MIN)
VITAMINA D3	800 UI (MIN)
VITAMINA E	30 UI (MIN)
FLAVOMICINA	3 mg
MONENSINA	24 mg
SACCHAROMYCES CEREVISIAE	60x10 ³ UFC