



## BORREGO MAIS R

**Descrição:** Ração para Ovinos.

**Composição:** Milho moído (Milho transgênico; espécie doadora de gene: *Bacillus thuringiensis*), farelo de soja integral (soja transgênica: espécie doadora de gene: *Agrobacterium sp*), refinazil, fosfato bicálcico, calcário calcítico, cloreto de sódio (sal comum), ureia pecuária, ureia protegida (Prote-N), vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de cobalto, sulfato de zinco, enxofre pecuário, cloreto de potássio, sulfato de cálcio, óxido de magnésio, óxido de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, *Ruminobacter amylophilum*, *Ruminobacter succinogenes*, *Succinovibrio dextrinosolvens*, *Bacillus cereus*, *Lactobacillus acidophilus*, *Enterococcus faecium*, extrato de levedura (*Saccharomyces cerevisiae*), levedura autolisada de cana de açúcar, aditivo sensorial aromatizante, aditivo tecnológico antioxidante, anticoccidiano (Lasalocida), veículo q.s.p (caulim).

**Indicações de uso:** Indicado para ovinos na fase inicial.

**Modo de usar:** Produto pronto para uso. Fornecer à vontade em cochos limpos e cobertos.

**Restrições:** Não utilizar na alimentação de cavalos ou outros equídeos. A ingestão pode ser fatal.

Este produto contém ionóforos, a sua utilização simultânea com certas substâncias medicamentosas pode ser contraindicada, especialmente a sulfadimetoxina. A lasalocida é incompatível com a tiamulina.

Este produto contém UREIA, e exige sempre a consulta prévia a um médico veterinário ou zootecnista e os seguintes cuidados para seu uso:

- Oferecer aos animais preferencialmente em cochos cobertos e com sistema de escoamento de água, para que jamais acumulem água;
- A quantidade de cochos deve ser calculada de acordo com o número de animais que consumirão o produto, e deve-se manter o cocho sempre com produto, evitando a oferta de grandes quantidades, pois os animais maiores tendem a alimentar-se primeiro e ingerir quantidades maiores que o recomendado;
- Manter o acesso dos animais a pastagens ou a alimentos volumosos;
- Não utilizar o produto em animais em jejum, famintos ou debilitados e após submeter os animais a movimentações em trajetos longos;
- Em casos de fornecimento em excesso, os sinais de intoxicação são: respiração difícil, nervosismo, desequilíbrio e salivação excessiva. Procurar imediatamente um médico veterinário de sua confiança.

Este produto é de uso exclusivo de OVINOS, sendo tóxico para animais não ruminantes.

**Apresentação:** Embalagens de 25 Kg.

### Níveis de garantia por kg de produto:

UMIDADE -----	120 g (MÁX.)
PROTEÍNA BRUTA -----	225 g (MÍN.)
EXTRATO ETÉREO -----	25 g (MÍN.)
MATÉRIA FIBROSA -----	50 g (MÁX.)
FIBRA EM DETERGENTE ÁCIDO (FDA) -----	6.000 mg (MÁX.)
MATÉRIA MINERAL -----	120 g (MÁX.)
CÁLCIO -----	14 g (MÁX.)
CÁLCIO -----	4.000 mg (MÍN.)
FÓSFORO -----	5.500 mg (MÍN.)
SÓDIO -----	2.500 mg (MÍN.)
ENXOFRE -----	1.500 mg (MÍN.)
FERRO -----	40 mg (MÍN.)
COBRE -----	5 mg (MÍN.)
MANGANÊS -----	80 mg (MÍN.)
ZINCO -----	250 mg (MÍN.)
MAGNÉSIO -----	1.700 mg (MÍN.)
CROMO -----	0,3 mg (MÍN.)
COBALTO -----	3 mg (MÍN.)
IODO -----	2,5 mg (MÍN.)
SELÊNIO -----	1 mg (MÍN.)
LASALOCIDA -----	210 mg