



CONCENTRADO MAIS LEITE

Descrição: Concentrado para vacas em Lactação.

Composição: Farelo de soja (soja transgênica: espécie doadora de gene: *Agrobacterium sp*), Uréia protegida (Prote-N), Uréia pecuária, Fosfato bicálcico, calcário calcítico, cloreto de sódio (sal comum), sulfato de cálcio, óxido de magnésio, sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de cobre, enxofre pecuário, cromo complexado, sulfato de cobalto, iodato de cálcio, selenito de sódio, vitamina AD3, vitamina E, extrato de leveduras (*Saccharomyces cerevisiae*), levedura de cana de açúcar inativada, aditivo sensorial aromatizante, aditivo zootécnico melhorador de desempenho (flavomicina), anticoccidiano (Monensina sódica), veículo q.s.p

Indicações de uso: Indicado para vacas de alta performance.

Modo de usar: Misturar o Concentrado ao Milho Moído, conforme teor (%) de PB (proteína bruta) necessário na ração das vacas em lactação.

Concentração de PB (%)	Modo de usar
18 %	75% de milho moído + 25% do CONCENTRADO MAIS LEITE
20 %	70% de milho moído + 30% do CONCENTRADO MAIS LEITE
22%	65% de milho moído + 35% do CONCENTRADO MAIS LEITE
Fornecer em média 1 kg da ração para cada 3 kg de leite produzido.	

Restrições: Não utilizar na alimentação de patos, gansos, pombos.

Não utilizar na alimentação de cavalos ou outros eqüídeos. A ingestão pode ser fatal.

Este produto contém URÉIA, e exige sempre a consulta prévia a um médico veterinário ou zootecnista e os seguintes cuidados para seu uso:

- Fornecer preferencialmente em cochos de sal coberto e com sistemas que evite o acúmulo de água;

- A quantidade de cochos deve ser calculada de acordo com o número de animais que consumirão o produto, e deve-se manter o cocho sempre com produto, evitando a oferta de grandes quantidades,

pois os animais maiores tendem a alimentar-se primeiro e ingerir quantidades maiores que o recomendado;

- Manter o acesso dos animais a pastagens ou a alimentos volumosos;

- Não utilizar o produto em animais com menos de dois meses de idade, em jejum, famintos ou debilitados e após submeter os animais a movimentações em trajetos longos;

- Em casos de fornecimento em excesso, os sinais de intoxicação são: respiração difícil, nervosismo, desequilíbrio e salivação excessiva. Procurar imediatamente um médico veterinário de sua confiança.

Este produto é de uso exclusivo de BOVINOS, sendo tóxico para animais não ruminantes.

Apresentação: Embalagens de 25 Kg.

Níveis de garantia por kg de produto:

PROTEÍNA BRUTA-----	485 g (MIN)
NNP EQUIVALENTE PROTEICO -----	140 g (MAX)
CALCIO-----	55 g (MAX)
CALCIO-----	34 g (MIN)
FOSFORO -----	6.000 mg (MIN)
SODIO-----	8.000 mg (MIN)
VITAMINA A-----	20.000 UI (MIN)
VITAMINA D3-----	4.000 UI (MIN)
VITAMINA E-----	150 UI (MIN)
ENXOFRE -----	145 mg (MIN)
FERRO -----	100 mg (MIN)
COBRE -----	70 mg (MIN)
MANGANES-----	85 mg (MIN)
MAGNÉSIO-----	2.500 mg (MIN)
COBALTO-----	2 mg (MIN)
CROMO -----	0,8 mg (MIN)
ZINCO-----	250 mg (MIN)
IODO -----	4 mg (MIN)
SELENIO-----	2,5 mg (MIN)
MONENSINA SODICA -----	80 mg
FLAVOMICINA-----	10 mg